

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SON DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 778/CV-UBND

Sơn Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2026

V/v phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa vụ Xuân
năm 2026

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Dịch vụ công xã;
- Các ông (bà) Trưởng các thôn trong xã.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời gian tới thời tiết có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của lúa đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại.

Theo kết quả điều tra nắm bắt tình hình trên đồng ruộng, hiện nay trên cây lúa vụ xuân: Trà chính vụ đang giai đoạn làm đòng- ôm đòng, trà muộn đang giai đoạn đẻ nhánh rộ- đứng cái. Cây lúa sinh trưởng phát triển khá tốt đồng thời xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại như: Chuột hại, bệnh đạo ôn lá, bệnh bạc lá - ĐSVK, Rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh khô vằn...

Để chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả các loại sâu bệnh, ngăn chặn sự lây lan của dịch hại trên đồng ruộng, bảo vệ năng suất cây lúa vụ Xuân năm 2026,

Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với các Ông/bà Trưởng các thôn thông báo, hướng dẫn biện pháp phòng chống một số đối tượng dịch hại như sau:

1. Đối với bệnh đạo ôn lá:

*** Đối với bệnh đạo ôn lá**

- Khi ruộng bị nhiễm bệnh đạo ôn lá dùng ngay bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá; giữ mực nước ổn định từ 1-3 cm trên mặt ruộng (*không được để ruộng bị khô hạn*).

- Phun phòng trừ ngay khi bệnh đạo ôn lá mới phát sinh, phun bằng một trong các loại thuốc như: Ninja 35SE, Filia® 525SE, Trizole 75WG, Nativo 750WG, Fuji-One 40EC, Beamvil-super 250SC, Kabim 30WP hoặc các loại thuốc khác có cùng hoạt chất được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

*** Đối với bệnh đạo ôn cổ bông**

- Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho các ruộng gieo cấy giống lúa nhiễm bệnh như: BC15, HT1, Thiên ưu 8, J02, nếp... ở những khu ruộng hàng năm thường phát sinh bệnh đạo ôn; các ruộng đã bị nhiễm bệnh đạo ôn lá. Phun trước

khi lúa trổ và sau khi lúa trổ từ 5 - 7 ngày bằng các loại thuốc như đối với phòng trừ đạo ôn lá.

Chú ý: Khi phun thuốc phòng trừ bệnh nông độ và liều lượng thuốc phải theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc, tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc. Nếu bệnh nặng tiến hành phun kép 2 lần, cách nhau từ 5-7 ngày. Không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc vừa mưa xong, lá lúa còn ướt, những ruộng phun xong gặp mưa (*trong vòng 4 giờ*) phải phun lại.

2. Chuột hại

*** Các biện pháp diệt chuột**

Để tổ chức phòng, chống chuột an toàn, hiệu quả bảo vệ sản xuất, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp như sau:

- Biện pháp canh tác: Trước khi gieo trồng các địa phương cần tập trung tuyên truyền nông dân thực hiện tốt vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư cây trồng, làm sạch cỏ ven bờ, phát quang bờ bụi hạn chế nơi trú ngụ của chuột. Sử dụng nilon để che phủ mạ, vừa chống rét đồng thời ngăn ngừa chuột gây hại. Gieo cây tập trung thời vụ, đồng loạt để cắt nguồn thức ăn thích hợp kéo dài trong giai đoạn lúa đòng trổ và chín. Giữ nước thường xuyên trong ruộng lúa để hạn chế chuột gây hại.

- Biện pháp thủ công, cơ học: Đào bắt và phá ổ chuột ngay từ đầu vụ hoặc trong các đợt lũ khi chuột co cụm tại các bờ cao, gò, đồi, bờ ao, bãi hoang kết hợp với việc tổ chức diệt chuột đồng loạt ngay từ đầu vụ... Sử dụng các loại bẫy chuột (*bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt...*) đặt trên lối đi của chuột và khu vực gây hại để thu bắt chuột. Nếu bẫy dùng mồi có thể đặt mồi vài ba ngày cho chuột ăn quen mới đặt bẫy mồi trước khi mặt trời lặn và thu bẫy vào buổi sáng sớm, thời điểm đặt bẫy tốt nhất là giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng.

- Biện pháp sinh học: Khuyến khích và hỗ trợ nông dân nuôi và bảo vệ đàn mèo để diệt chuột. Nghiêm cấm săn bắt các loại động vật là thiên địch của chuột như: Mèo, Rắn, Chim cú mèo... để quản lý chuột.

- Biện pháp sử dụng các loại bả sinh học, thuốc diệt chuột: Sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít độc hại với người, vật nuôi và môi trường; chỉ dùng thuốc hóa học khi chuột phá hại mạnh và tuân thủ nghiêm ngặt an toàn. Sử dụng một trong các loại thuốc diệt chuột như: Storm 0.005% block bait, Rat-kill 2% DP, Rat K 2% DP, Krats 0.005% pellet, Racumin 0.75TP, Klerat® 0.005% wax block bait...

- Nghiêm cấm sử dụng điện để diệt chuột.

3. Bệnh bạc lá – Đốm sọc vi khuẩn: Bệnh phát triển mạnh sau các trận mưa giông, gió lốc làm dập xước lá lúa tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhiễm, gây hại. Khi bệnh mới xuất hiện xử lý bằng một trong các loại thuốc sau: Avalon 8 WP, Kamycinusa 75SL, Aluminy 800WG...

4. Bệnh khô vằn: Bệnh thường hại nặng từ giai đoạn lúa ôm đòng trở đi. Phát hiện bệnh sử dụng một trong các loại thuốc sau để phun trừ: Royal 350 SC, Tiltsuper 300ND, Anvil 5SL...

5. Rầy nâu - rầy lưng trắng: Hiện nay rầy lúa 2 đang gây hại chủ yếu tuổi 2,3,4 mật độ phổ biến 50-150 con/m², nơi cao 400-500 con/m². Dự tính Rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 3 sẽ nở rộ và gây hại nặng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Phun trừ rầy nơi có mật độ cao bằng một trong các loại thuốc: Chery 70WG, Matoko 50WWG, Vitagro 50EC...

Ngoài ra cần lưu ý một số đối tượng khác như: ruồi đục nõn, sâu đục thân, bệnh thối thân vi khuẩn...

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ông (bà) Trưởng thôn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Ủy ban nhân dân xã (qua phòng Kinh tế) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Chánh, Phó CVP HĐND&UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT (T 3b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Thành