SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH TUYÊN QUANG -
CHI CỤC TRỒNG TRỌT
VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG

(Từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2026)


TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

20 - 24°C (Thấp nhất 16-18°C, Cao nhất 28-30°C). Đêm & sáng trời lạnh.

80 - 84%

Mưa rào nhẹ vài nơi. Cây trồng phát triển ổn định.

TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG




TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU



Sâu keo mùa thu.
Mật độ: 1 - 2 con/m² (Nơi cao 3-4 con/m²). Đã xử lý 16/16 ha.



Bệnh vàng lá thối rễ, ruồi đục quả.
Tỷ lệ hại: 3 - 5% (Nơi cao 8-10%). Đã xử lý 50/56 ha.

Rau & Chè: Sâu xanh, bọ nhảy, rầy xanh xuất hiện rải rác (2-4 con/m² hoặc **2-4% búp**). Đã và đang phòng trừ thường xuyên.

Gemini Notebook

DỰ BÁO TÌNH HÌNH & ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ (7 NGÀY TỚI)

CÂY TRỒNG	CẢNH BÁO DỊCH HẠI	BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Ngô đông 	**Sâu keo mùa thu** tiếp tục phát sinh ở giai đoạn 5 lá -xoáy nõn, thụ phấn. Mật độ: 1 - 3 con/m^2.	- Kiểm tra đồng ruộng thường xuyên; - Bắt sâu, ngắt ổ trứng thủ công; - Phun thuốc BVTV sinh học/hóa học khi mật độ >3 con/m^2
Rau vụ Đông 	**Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang** gia tăng mật độ (5 - 10 con/m^2).	- Canh tác an toàn, luân canh; - Dùng bẫy dính màu vàng diệt bọ nhảy; - Phun thuốc sinh học (đảm bảo thời gian cách ly).
Cam 	**Vàng lá thối rễ, bệnh sẹo, nhện đỏ** tiếp tục lây lan trên vườn chưa thu hoạch.	- Vệ sinh vườn, cắt tỉa cành, tiêu hủy quả rụng - Bón phân cân đối + hữu cơ vi sinh - Xử lý gốc bằng thuốc đặc trị vàng lá thối rễ.
Chè & Lâm nghiệp (Keo) 	Rầy xanh, bọ xít muỗi gây hại nhẹ búp chè Sâu ăn lá keo xuất hiện rải rác.	- Thu hái búp đúng lứa để loại bỏ trứng rầy - Theo dõi chặt sâu ăn lá rừng trồng - Báo cáo Trạm BVTV ngay khi phát hiện ổ dịch.

CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN: Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị Trạm Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật các khu vực phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường tăng cường bám sát cơ sở, hướng dẫn nông dân thực hiện phòng trừ kịp thời, hiệu quả và an toàn

Gemini Notebook