

HƯỚNG DẪN
Công tác phòng và điều trị một số bệnh thường gặp
trên đàn vật nuôi

Để giúp người chăn nuôi nắm được triệu chứng và kỹ thuật phòng, điều trị một số bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi. Trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông và Chi cục Thú y hướng dẫn Công tác phòng và điều trị một số bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi như sau:

1. Bệnh cúm gia cầm

1.1 Triệu chứng

gia cầm mắc bệnh thường bị chết đột ngột và không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Tỷ lệ chết có thể lên tới 100% tổng đàn trong vòng vài ngày; gia cầm đi không bình thường, loạng choạng, lắc đầu, run rẩy, mệt mỏi, nằm tụ tập từng đám...

1.2 Biện pháp phòng chống

An toàn sinh học trong chăn nuôi là giải pháp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của mầm bệnh như vi rút, vi khuẩn... để bảo vệ đàn gia cầm an toàn dịch bệnh.

- Phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin: Thực hiện tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm theo đúng hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản. Gia cầm đã tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm chỉ được xuất bán, giết thịt sau khi tiêm phòng đủ 14 ngày và gia cầm phải khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh.

- Chuồng nuôi gia cầm, thủy cầm đảm bảo diện tích phù hợp với quy mô chăn nuôi; cách xa các điểm như: Khu dân cư, chợ, cơ sở giết mổ động vật, đường giao thông lớn...; khu chuồng nuôi phải có hố khử trùng, tường rào bao quanh với chiều cao tối thiểu 2m. Cơ sở hành chính của trại phải cách biệt khu chăn nuôi.

- Đảm bảo nguyên tắc cùng nhập, cùng xuất, sau mỗi đợt xuất hết gia cầm, phải vệ sinh tiêu độc, khử trùng và để trống chuồng trại trong một thời gian rồi mới nuôi đợt mới. Thực hiện cách ly và kiểm soát gia cầm giống mới nhập về (mua gia cầm giống từ cơ sở an toàn dịch bệnh và thực hiện cách ly ít nhất 14 ngày).

- Kiểm soát con người: Hạn chế khách tham quan, đi lại giữa các khu; người vào khu chăn nuôi cần mặc quần áo bảo hộ lao động dùng riêng trong khu chăn nuôi.

- Phương tiện vận chuyển: Các xe vận chuyển trước khi vào trại phải được phun xịt khử trùng bằng hoá chất (chú ý bánh xe, gầm xe).

- Dụng cụ chăn nuôi, trang thiết bị, thức ăn, nước uống của mỗi khu trại chăn nuôi phải sử dụng riêng biệt; không mang sản phẩm thịt gia cầm vào trại để sử dụng.

- Kiểm soát côn trùng, động vật khác: Có biện pháp ngăn các động vật như chó, mèo, chim, chuột và côn trùng... xâm nhập vào chuồng nuôi.

- Vệ sinh chuồng trại: Định kỳ hàng tuần phải vệ sinh, khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực chuồng trại; phát quang, khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột, phun xịt thuốc sát trùng; chất thải, chất độn chuồng thay ra phải được xử lý khử trùng hoặc chôn, đốt. Hàng ngày phải vệ sinh các dụng cụ chăn nuôi như máng ăn, máng uống ...

- Khi thấy gia cầm có hiện tượng ốm, chết, nghi mắc cúm phải báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở, chính quyền địa phương; không bán chạy hoặc ăn thịt gia cầm trong đàn bị bệnh; không vứt xác gia cầm chết và chất thải bừa bãi. Việc tiêu hủy gia cầm có kết quả xét nghiệm dương tính vi rút cúm A/H5N1, A/H5N6 hoặc chủng vi rút cúm có khả năng truyền lây bệnh và gây tử vong cho người nên phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y.

2. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

2.1. Triệu chứng, bệnh tích

- Thể quá cấp tính: Là do vi rút có độc lực cao, lợn sẽ chết nhanh, không biểu hiện triệu chứng hoặc lợn sẽ nằm và sốt cao trước khi chết.

- Thể cấp tính: Là do vi rút có độc lực cao gây ra, lợn sốt 40,5-42°C và không ăn, ít vận động, ủ rũ, thích nằm chỗ có bóng râm hoặc gần nước, có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường, một số vùng da chuyển màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, chân, da phần dưới vùng ngực và bụng, có thể có màu sẫm xanh tím.

Trong 1-2 ngày, trước khi con vật chết có triệu chứng thần kinh, di chuyển không vững, nhịp tim nhanh, thở gấp, khó thở hoặc có bọt lẫn máu ở mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón,... Lợn sẽ chết trong vòng 6-13 ngày hoặc có thể kéo dài đến 20 ngày.

- Thể á cấp tính: Là do vi rút có độc lực trung bình gây ra, bệnh kéo dài 5-30 ngày, tỷ lệ chết khoảng 30-70 %. Lợn có thể khỏi hoặc bị bệnh mãn tính.

- Thể mãn tính: Triệu chứng kéo dài 2-15 tháng, có tỷ lệ chết thấp, lợn khỏi bệnh sau khi nhiễm vi rút gây nên bệnh sẽ trở thành dạng mãn tính.

2.2. Cách phòng bệnh

- Hiện nay chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh Dịch tả lợn châu Phi vì vậy giải pháp phòng bệnh là chính, phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi ở phạm vi nhỏ và chưa lây lan.

- Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất và quan trọng nhất; thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn nuôi lợn, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi và vệ sinh cá nhân tham gia chăn nuôi; thực hành chăn nuôi tốt và an toàn dịch bệnh.

3. Bệnh Viêm da nổi cục

3.1. Triệu chứng, bệnh tích

- Trâu, bò thường sốt cao trên 41°C, bỏ ăn, suy nhược, giảm tiết sữa; có thể viêm mũi, viêm mắt, chảy nhiều nước bọt và sung hạch.
- Đặc trưng là xuất hiện các nốt sần cứng, nổi gồ trên da, đường kính 2–5 cm, tập trung ở đầu, cổ, chân và bầu vú. Nốt sần có thể hoại tử, loét, để lại sẹo lâu dài.
- Con vật có thể phù nề, chảy dịch ở chân và vùng bụng, đi lại khó khăn. Bệnh còn có thể gây vô sinh ở bò đực và sảy thai ở bò mang thai.

3.2. Khi trâu, bò chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục

- Người chăn nuôi chủ động theo dõi, kịp thời phát hiện các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực chăn nuôi. Chỉ nhập, tiếp nhận trâu, bò rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch theo quy định. Thực hiện tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò.

3.3 Khi phát hiện biểu hiện của bệnh

- Tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có trâu, bò bị bệnh.
- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục theo hướng dẫn của cơ quan Thú y.

Trên đây là hướng dẫn công tác phòng chống một số loại bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi. Đề nghị các hộ chăn nuôi chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng thú y cơ sở, thực hiện nghiêm túc các quy định nhằm không chế, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Sở NN&MT (thay báo cáo);
- Báo & PT-TH tỉnh
- Chi cục CNTY&TS
- Trung tâm DVC các xã, phường
- Lãnh đạo TTKN;
- Các phòng chuyên môn;
- Trang TTĐT, Fanpage TTKN;
- Lưu VT.

(Phối hợp
tuyên truyền);



GIÁM ĐỐC

Hoàng Hồng Trường