

Số: *11* /UBND-NLN
Về việc tăng cường phòng trừ sâu
bệnh trên cây ngô xuân 2019

Nghĩa Thuận, ngày 03 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Các đồng chí cán bộ công chức xã phụ trách xã các thôn;
- Các thôn trên địa bàn xã;

Hiện nay cây ngô xuân đã gieo trồng đang trong giai đoạn từ 4 lá – phun râu. Thời tiết mát mẻ, ẩm độ cao là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh phát triển, đặc biệt là sâu xám, sâu ăn lá, sâu đục thân, bệnh đốm lá... Qua kiểm tra tại các thôn trên địa bàn xã hiện nay một số diện tích cây ngô đã xuất hiện sâu xám, sâu đục thân, bệnh đốm lá, đặc biệt là sâu ăn lá phát sinh gây hại.

Đề chủ động trong công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại tránh ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng, phát triển của cây ngô xuân,

Chủ tịch ủy ban nhân dân xã chỉ đạo như sau:

1. Giao các đồng chí cán bộ, công chức xã phụ trách các thôn phối hợp với Ban phát triển thôn kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên cây ngô tại các thôn và báo cáo kịp thời về Thường trực UBND xã.

2. Giao cho đồng chí cán bộ Địa chính nông nghiệp xã tăng cường kiểm tra đồng ruộng; đồng thời phối hợp với các đồng chí cán bộ công chức phụ trách các thôn, các đồng chí trưởng thôn, đội ngũ khuyến nông viên thôn bản và các hộ nông dân cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

*** Đối với sâu xám, sâu ăn lá:**

- Tìm bắt giết sâu vào buổi sáng khi mật độ thấp.
- Dùng một trong số các loại thuốc hoá học như: Vibam 5G, Kayazinon 10G, Vibasun 10H, Vicarp 4H... để giết (diệt sâu xám); hoặc sử dụng thuốc Sherpa 10EC/25EC, Karate 2,5EC, Virtako 40 WG, Voliam Targo 063SC, Obaone 95 WG, Clever 150 SC... để phun trừ sâu xám, sâu ăn lá khi mật độ sâu cao, cần phun bao vây và triệt để tránh sâu bệnh lây lan ra diện rộng (*Phun diệt sâu xám vào buổi chiều mát hiệu quả mới cao*).

- Đối với sâu đục thân dùng một trong số các loại thuốc hoá học như: Sherpa 0,1%, Sumidicin 0,1%, Nuvacron polytril 440 Regent 800WG 0,08-0,12% hoặc một số thuốc đặc hiệu khác để phun với liều lượng 0,5-1 lít/ha.

*** Đối với bệnh đốm lá:**

- Cắt tia các lá bị bệnh đem tiêu hủy.

- Dùng một trong số các loại thuốc hoá học như: Avil5-10EC; Benlate50WP; Aliette 800WG; Tilt 250EC,... Phun 1-2 lần, cách nhau 7-10 ngày, nồng độ và liều lượng dùng theo hướng dẫn in trên bao bì của nhà sản xuất. **(Chú ý: khi phun thuốc cần thực hiện tốt nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc, đúng cách), thu gom bao bì thuốc sau sử dụng đúng nơi quy định.**

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các ngành, bộ phận, các thôn trên đại bàn xã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- T.Tr Đảng ủy xã;
- T.Tr HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

Lê Thanh Chiến